

Ihre Patientin/Ihr Patient hat einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus und appliziert

Lantus[®], Levemir[®], Abasaglar[®] oder Toujeo[®]

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

- 2 Tage vor der Untersuchung: normale Applikation. Bei Hypoglykämie-Neigung oder sehr scharfer Einstellung (HbA1c <6.5%); 2/3 der gewohnten Insulindosis
- 1 Tag vor der Untersuchung:
 - **Basis-Insulin am Abend:** die Hälfte der gewohnten Dosis und Kontrolle des Blutzuckers vor dem Zubettgehen (< 6 mmol/l: Zwischen-Mahlzeit und nachmessen)
 - **Basis-Insulin am Morgen:** 2/3 der gewohnten Dosis und Kontrolle des Blutzuckers im Tagesprofil
- am Untersuchungstag:
 - **Basis-Insulin am Abend:** abends wieder die gewohnte Dosis, vorausgesetzt, dass die Patienten normal essen können und die Blutzuckerwerte vor dem Abendessen über 6 mmol/l liegen
 - **Basis-Insulin am Morgen:** die Hälfte der gewohnten Dosis NACH der Endoskopie, vor dem Essen. Blutzucker-Tagesprofil

Wir möchten Sie bitten, das Vorgehen mit dem Patienten zu besprechen.

Wir danken für die Zusammenarbeit und stehen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.